

ALOY TRICALCIUM

GYORSAN FELVEHETŐ, ILLETVE TARTAMHATÁST BIZTOSÍTÓ,
FOLYÉKONY KALCIUM LEVÉLTRÁGYA MANGÁNNAL ÉS CINKKEL

EK-MŰTRÁGYA



GYÁRTJA:

SAFAGROW LTD.

1 Stapledon Road, Orton Southgate,
Peterborough, PE2 6TB., Egyesült Királyság



FORGALMAZZA: AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu

**GYERMEKEK ELŐL EL KELL ZÁRNI!
FELHASZNÁLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A CIMKÉN!
HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!**

Tűz- és robbanásveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően alaposan kezét kell mosni.

P280 Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL:

Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS

ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P321 Szakellátás (lásd a címkén).

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.

FIGYELEM



Összetétele:	26,4 % (m/m) kalcium (CaO)	(448 g/l)
	1,7 % (m/m) mangán (Mn)	(30 g/l)
	0,6 % (m/m) cink (Zn)	(10 g/l)

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól védve, fagymentes helyen, 5 és 35 °C közötti minőségét minimum 2 évig megőrzi.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK:

Használat előtt mindig olvassa el a címkét! **Használat előtt alaposan fel kell rázni!** A kanna kiürítését követően 2-3 alkalommal vízzel öblítsük ki azt, hogy a készítmény maradéktalanul kijöjjön belőle. Soha ne keverjünk tömény, higítottan készítményeket! Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a keverést. Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény teljesen feloldódott, illetve elkeveredett, mielőtt a következővel folytatnánk a keverést. A keverési sorrend a következő legyen:

- Vízkondicionáló, amennyiben szükséges, majd a por vagy granulátum formulációjú termékek (WP, DG)
- **Aloy Tricalcium** és egyéb folyékony készítmények (SC, SE)
- Emulzió koncentrátumok és növényi olajok (EC)
- Vízoldékony készítmények: folyékony és szilárd (SL, SP)
- Nedvesítő szer, amennyiben szükséges

Töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. Amennyiben követjük a fenti lépéseket, szinte valamennyi tankkeverék fizikailag kompatibilis lesz folyamatos keverés mellett. Ha a keverés nem kielégítő, illetve bármilyen egyéb probléma lép fel, a permetlértartályt azonnal tisztítsuk ki.

KEVERHETŐSÉG: A készítmény számos növényvédő szerrel és termésközelítővel keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! A tankkeveréket a felhasználó saját felelősségére készíti és használja fel. Az ebből eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

HULLADÉKKEZELES: Kerülni kell a tömény készítmény vízfolyásba jutását. A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosófolyadékot a permetlértartályba tölteni. Az üres és gondosan kiöblített kannát, valamint az egyéb csomagolóanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, elszállíttatni és megsemmisíteni.



Nettó tartalom: **5 L** (=8,86 kg)

Agrometry

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Kultúra	Dózis (l/ha)	Kijuttatási idő
Permetlémenyiség: minimum 200 l/ha, amennyiben nincs egyéb javaslat.		
Alma, körte	2,0-3,0	Pirosbimbós állapot és virágzás kezdete között (BBCH 57-61) egy alkalommal.
		Sziromhullástól (BBCH 69) 1 hónappal a várható szüret előtti időpontig (BBCH 82) 10-14 naponként kezeljük.
		Vízmenyiség: min. 500 l/ha.
Cseresznye-meggy	2,0-3,0	Eltarthatóság (piacosság) javítására, kirepedés kockázatának csökkentésére. Virágzást követően 10-14 naponként megismételve szükség szerint.
Egyéb csonthéjasok	2,0-3,0	Hiánytünetek megelőzésére, eltarthatóság (piacosság) javítására. Virágzást követően 10-14 naponként megismételve szükség szerint.
Szőlő	2,0-3,0	Hiánytünetek megakadályozására, bogyórepedés kockázatának csökkentésére, eltarthatóság (piacosság) javítására, virágzást követően 10-14 naponta megismételve.
Búza	2,0-3,0	Hiánytünetek megakadályozására, szárszilárdítás elősegítésére szárbaindulás időszakától 2-3 alkalommal szükség szerint.
Egyéb szántóföldi kultúrák	2,0-3,0	Stresszhatás esetén, hiánytünetek megelőzésére, szükség szerint 2-3 alkalommal.
Uborkafélék (szabadföldi)	2,0-3,0	Stresszhatás esetén, hiánytünetek megelőzésére, 10-14 naponként.
Paradicsom, paprika (szabadföldi)	2,0-3,0	Stresszhatás esetén, hiánytünetek megelőzésére virágzás kezdetétől (BBCH 61) 7-10 naponként 3-5 alkalommal. Minimum lémenyiség 500 l/ha.
Hagymafélék (szabadföldi)	2,0-3,0	10-14 nappal kelés vagy ültetés után kezeljük, majd szükség szerint 10-14 naponként ismételjünk.
Burgonya	2,0-3,0	14 nappal kelés után kezeljük, majd szükség szerint 10-14 naponként ismételjünk.
Gyökérzöldségek	2,0-3,0	Hiánytünetek esetén 10-14 naponként kezeljük.
Szamóca	2,0-3,0	Virágzás kezdetétől 10-14 napos időközönként kezeljük.