

Szuszpenzió Koncentrátum (SC) Hatóanyaga: 420 g/l (41,18 m/m %) karboxilált sztirol-butadién kopolimer



ARR/18/01/HU/F

# Arrest®

Permetezőszer  
segédanyag

Felhasználható őszi káposztarepcében pergési veszteség csökkentésére

Engedélyszám: 04.2/4491-1/2017 NÉBIH Forgalmazási kategória: II.

Az engedélyokirat tulajdonosa: Intracrop® A division of Brian Lewis Agriculture Ltd. Park Chambers, 10 Hereford Road, Abergavenny Monmouth NP7 5 PR, UK.

Gyártó: Amega Sciences Plc. Unit 17, Lanchester Way, Royal Oak Industrial Estate, Daventry, Northamptonshire NN11 8PH, UK.

Címkéért felelős személy:

Laczkóné Spilák Krisztina 1029 Budapest, Péch Antal u. 13.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:  
a csomagolóburkolaton található

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz,  
hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év

Agrometry 

Forgalmazó: Agrometry Kft. 2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.  
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915 E-mail: info@agrometry.hu

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A  
KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK  
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL  
TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
ELŐÍRÁSAIT.

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA  
TARTANDÓ!

FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA  
EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS  
GYŐZDJÖN MEG ARRÓL, HOGY  
MEGÉRTETTE!

Mérgezősör vagy annak  
gyanújakor az Egészségügyi  
Toxicológiai Tájékoztató  
Szolgálat díjmentesen, 24 órán  
keresztül hívható zöld száma:  
06 80 201 199.

CSEBER Nonprofit Kft.

növényvédő  
szerrel szennyezett  
csomagolóanyag  
gyűjtőhelyeinek  
listája megtalálható

a <http://www.cseber.hu> címen  
Tel.: +36 1 340 4888 A kiürült  
és tisztított csomagolóeszközök  
újrafelhasználása tilos!



NETTÓ TARTALOM: **5L**

# Arrest®

## EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteleles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteleles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteleles

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés szükséges. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P307+P311 Expozíció esetén: forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!



## VESZÉLY

## FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Az alkalmazás célja	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi káposztarepce	pergési veszteség csökkentése	1,0	300-500 60-80 (légi)	becősárgulás (BBCH 80) – becők 70 %-a érett, fekete és kemény magvakkal (BBCH 87)

**Egyéb környezetvédelmi előírások:** A készítmény biztonságos felhasználásának érdekében az egyidejűleg alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

### Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő.

Kijuttatóknak: védőkesztyű. Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén orvosi ellátást kell biztosítani. **Hánytatni TILOS!**

**Terápia:** tüneti, figyelővel kezelés.

**Ellenanyag:** specifikus antidótuma nincs.

### Várakozási idő:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap  
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

### Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!

A készítmény a becőtermésre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergetését, ezért különösen alkalmas várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergetéséből adódó termésveszteség csökkentésére.

Állományszáritásra engedélyezett készítménnyel egy menetben is kijuttatható.

**Őszi káposztarepcebén** a készítményt önmagában a becősárgulás idején, a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, amikor a becők 30%-a már érett. Állományszáritó készítményekkel kombinációban a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-10 nappal kell kijuttatni. Önmagában kijuttatva, illetve állományszáritó készítményekkel kombinációban felhasználva 1,0 l/ha dózisban kell felhasználni. Földi géppel történő kijuttatás esetén 300-500 l/ha vízmennyiséggel javasolt kipermetezni.

**Légi kijuttatás:** engedélyezett.

Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

