Ciprodor Extra

ÉLETTANI HATÁSSAL RENDELKEZŐ GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

A készítmény azoxistrobin-tartalma miatt kiemelkedő élettani, juvenilizáló hatással bír. Ennek köszönhetően fokozódik a kezelt növény tápanyagfelvétele, fotoszintézise intenzívebbé válik, nő a termés mennyisége, beltartalmi mutatói javulnak. Hatására a növények aszálytűrése fokozódik, az etilénszintézisre kifejtett gátló hatása miatt a növényi sejtek öregedési folyamatai lassulnak. A kezelt növény hosszabb ideig zöld marad, mivel életfolyamatai magasabb szinten zajlanak, intenzívebbek.

AZOXISTROBIN hatóanyaga felszívódó hatású, a növény nedvkeringésébe kerülve csúcsi irányba szállítódik. A mitokondriális légzést gátolja, ezáltal akadályozza a kórokozó spórájának csírázását, a csíratömlő, a micélium növekedését.

CIPROKONAZOL hatóanyaga felszívódó hatású, a növény nedvkeringésbe kerülve csúcsi irányban gyors ütemben szállítódik, transzlamináris hatásának köszönhetően a levéllemez belseje felé is elmozdul. Hatását a gombasejt ergoszterol-szintézisének gátlásán keresztül fejti ki.

A két hatóanyag kombinációja megelőző és gyorsan kialakuló gyógyító hatást biztosít. Vízoldékonyságuk és fotostabilitásuk kiemelkedő, ezért még intenzív sugárzás mellett sem romlik a hatékonyságuk. A formázásnak köszönhetően a készítmény esőállósága kiváló, hatástartama hosszú.

Agrometry

HATÓANYAG-TARTALOM:
200 g/l azoxistrobin
80 g/l ciprokonazol

FORMULÁCIÓ:
szuszpenzió koncentrátum (SC)

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA:
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:
0 nap. (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG:
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA	ÉVI (nap)
Kalászosos	35
Őszi káposztarepce, napraforgó, borsó	28
Kukorica	nem jelölés-köteles

A Ciprodor Extra készítmény azonos a 46464/2004. FVM engedélyszámú **MIRADOR XTRA** referenciatermékkel.

WWW.AGROMETRY.HU

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA, TAVASZI ÁRPA

A készítmény kijuttatását a levélbetegségek ellen megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, egy vagy két alkalommal kell elvégezni. Egy kezelésre alapuló technológiában a levélbetegségek elleni védekezést a 2-3 szárcsomós állapotban, vagy a zászlóslevél megjelenésekor kell elvégezni 0,75-1,0 l/ha dózis alkalmazásával. Osztott kijuttatáson alapuló technológia esetén az első kezelést a 2-3 szárcsomós állapotban kell elvégezni 0,6 l/ha, majd három héten belül ugyancsak 0,6 l/ha szermennyiség felhasználásával megismételni. A kalászfuzáriózis elleni védekezést a virágzás kezdete és a teljes virágzás állapota között kell elvégezni hektáronkénti 1,0 literes dózis felhasználásával.

NAPRAFORGÓ

A szárat és a leveleket megbetegítő kórokozókkal szembeni első védekezést megelőző jelleggel, 6-8 pár leveles korban, míg a tányérbetegségek elleni kezelést a csillagbimbós állapot, valamint a teljes virágzás időszaka között kell elvégezni, 0,8-1,0 liter hektáronkénti szermennyiség kijuttatásával.

A permetezés során tapadást fokozó adalékanyag felhasználás javasolt. A kezelés helikopteres kijuttatása, 60-80 liter hektáronkénti permetlé felhasználásával légi úton is elvégezhető.

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

A készítményt az állományt virágzáskor betegítő kórokozókkal szemben megelőző jelleggel a virágzás kezdetén, illetve a 50%-kos virágzásban szükséges kijuttatni 0,75-1,0 l/ha dózis felhasználásával.

Termésnövelés céljából a készítményt a terméskötődés fokozása, a becőképződés javítása érdekében a virágzás kezdetétől a virágzás végéig kell felhasználni. Az alkalmazott dózis megegyezik a kórokozókkal szembeni védekezésre ajánlott mennyiséggel. Kijuttatásakor tapadást fokozó adalékanyag használata szükséges!

KUKORICA

A készítmény kizárólag vetőmagelőállításban használható! A levélbetegségekkel szembeni védekezés során egy vagy két alkalommal juttatható ki. Egy kezelésre alapuló technológiában kijuttatását a tünetek megjelenésekor célszerű elkezdeni, a származnyúlástól a címerhányás végéig (7-12 leveles állapot) tartó fejlődési állapotban. Amennyiben az időjárási körülmények kedveznek a kórokozóknak, két kezelés elvégzése szükséges. Első, levélbetegségek elleni kijuttatására a korábbiakban javasolt állapotban, míg a második, csövet fertőző kórokozókkal szembeni kijuttatására a teljes virágzás időszakában kerüljön sor.



BORSÓ

A borsóban betegítő rozsda és lisztharmat megbetegedésekkel szemben a kezelést virágzás eleje és a hüvelyképződés időszaka között kell elvégezni. Peronoszpóra ellen a járványveszélyes időszakban megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kezelni. A permetezéskor a tapadást fokozó adalékanyag felhasználása javasolt.

Ciprodor Extra

A kijuttatás során kettősréses szórófej és közepes cseppméret alkalmazása javasolt, az alkalmazott vízmennyiség földigépes kijuttatásnál 250-300 liter, légi kijuttatásnál 60-80 liter hektáronként.

KULTÚRA	KÓROKOZÓ	DÓZIS (L/HA)	KEZELÉS IDEJE
Őszi búza, őszi és tavaszi árpa	Lisztharmat, rozsdabetegségek, helmintospóriumos megbetegedések, szeptória, kalászfuzáriózis.	Egyszeri: 0,75-1,0 Osztott: 0,6+0,6	Levélbetegségek: 2-3 szárcsomós állapot, zászlóslevél megjelenése. Kalászfuzáriózis: teljes virágzás állapota.
Borsó	Peronoszpóra, lisztharmat, rozsda.	0,6-0,8	Virágzás kezdete.
Napraforgó	Fehér- és szürkepenészes megbetegedések, diaporthe, alternária, fóma, rozsda, peronoszpóra.	0,8-1,0	6-8 pár leveles állapottól virágzásig.
Őszi káposztarepce	Fehérpenészes szárrothadás, fóma, alternária.	0,75-1,0	Virágzás kezdetétől a virágzás végéig.
Kukorica (vetőmag)	Levél és csőbetegségek.	0,5-1,0	Levélbetegségek ellen: 7-12 leveles állapot. Csőbetegségek ellen: teljes virágzás.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

WWW.AGROMETRY.HU

E-mail: info@agrometry.hu

Agrometry