

# PABI 300 EC

GOMBAÖLŐ SZER



A Pabi 300 EC gombaölő permetezőszer azonos a 6300/731-1/2021. NÉBIH

számon engedélyezett **Protendo 300 EC** gombaölő permetezőszerrel.

**Hatóanyaga:** 300 g/l protiokonazol (28,04 m/m%)

**Szerforma:** emulzióképző koncentrátum (EC)

**Forgalomba hozatali engedély száma:** 6300/731-3/2021. NÉBIH

**Forgalmazási kategória:** I.

**UFI:** W660-K07P-Y00A-F4SQ

**AZ ENGEDÉLYOKIRAT TULAJDONOSA,**

**A NÖVENYVÉDŐ SZER GYÁRTÓJA**

**GLOBACHEM N.V.**

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019

B 3800 St-Truiden, Belgium

Tel: +32 11 78 57 17

**FORGALMAZZA**

**AGROMETRY KFT.**

2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.

Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu

www.agrometry.hu

  
**Globachem**  
Your Crop Counts



**Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:** a csomagolóburkolaton található.

**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN  
BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.  
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!  
GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.**

Nettó tartalom: **5 liter**

**Agrometry** 



## EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): > 1445 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

H305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges!

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőknél keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyepek) biztonsági övezetet!

SpO 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

## EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

## MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVORENDSZABÁLYOK

Egyéni védőfelszerelés: *Előkészítőknél:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő); arcvédő. *Kijuttatóknál:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő); arcvédő.

### Elsősegélynyújtás:

*Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén* esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

**Terápia:** tüneti megfigyelő kezelés.

**Ellenanyag:** specifikus antidótuma nincs.

## VÁRAKOZÁSI IDŐK

**Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap (száradásig).

**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

őszi-, tavaszi búza, őszi-, tavaszi árpa, rozs, tritikálé: 35 nap

őszi-, tavaszi káposztarepce: 56 nap

## A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<b>búza</b> (őszi, tavaszi)	lisztharmat, levélorzsa, sárgarozsa, szeptóriás levélfoltosság, pirenofóras levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, kalászfuzáriózis	2	14	0,33-0,65	200-400	bokrosodásban az 5. mellékajtás megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás végéig (BBCH 69)
<b>tritikálé</b>	lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság	2	14	0,33-0,65	200-400	bokrosodásban az 5. mellékajtás megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás kezdetéig (BBCH 61)
<b>árpa</b> (őszi, tavaszi)	lisztharmat, törperozsa, pirenofóras levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság	2	14	0,33-0,65	200-400	bokrosodásban az 5. mellékajtás megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás kezdetéig (BBCH 61)
<b>rozs</b>	levélorzsa, rinhospóriumos levélfoltosság	2	14	0,33-0,65	200-400	bokrosodásban az 5. mellékajtás megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás kezdetéig (BBCH 61)
<b>káposztarepce</b> (őszi, tavaszi)	leptoszfériás (fómás) betegség	2 (1 őszi + 1 tavaszi)	86	0,3-0,6	200-400	összel 6 leveles állapottól (BBCH 16) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19), tavasszal az első oldalhajítások kialakulásától (BBCH 20) sárgabimbós állapotig (BBCH 59)
	leptoszfériás (fómás) betegség, szklerotiniás betegség (fehérpenész), alternáriás betegség (becórontó)	2 (2 tavaszi)	21	0,3-0,6	200-400	oldalhajítások kialakulásától (BBCH 20) virágzás végéig (BBCH 69)



## ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

**Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé) levélfoltosságok, lisztharmat és rozsdák** ellen a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismételni. *Szeptóriás pelyvafoltosság* ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslével megjelenésétől teljes virágzásig célszerű a permetezés elvégzése. *Kalászfuzáriózis* ellen a készítménnyel végzett kezelést a virágzás kezdetén javasolt végrehajtani, törekedve a kalászkok egyenletes permetlé fedettségére. A fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a *pirenofórák levélfoltosság* és a *kalászfuzáriózis* ellen az engedélyezett nagyobb dózis (0,65 l/ha) kijuttatása indokolt.

**Őszi és tavaszi káposztarepcében gombás betegségek** ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. *Leptoszfériás betegség* ellen a fertőzésre hajlamosító körülmények között javasolt egy őszi kezelés (őszi káposztarepce) elvégzése tölevélrózsás állapotban. A tavaszi kezelést az oldalhajtások képződésének idején indokolt végrehajtani. A *szklerotíniás* és *alternáriás betegségek* elleni permetezést a virágzás első felében szükséges elvégezni.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében készítményt ajánlott más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva kijuttatni.

## HATÁSMECHANIZMUS

A **protiokonazol** szterolbioszintézist gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 3).

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

**Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen,  
24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.**



**CSEBER Nonprofit Kft.**

növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen.

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!**

# PABI 300 EC

GOMBAÖLŐ SZER



A Pabi 300 EC gombaölő permetezőszer azonos a 6300/731-1/2021. NÉBIH

számon engedélyezett **Protendo 300 EC** gombaölő permetezőszerrel.

**Hatóanyaga:** 300 g/l protiokonazol (28,04 m/m%)

**Szerforma:** emulzióképző koncentrátum (EC)

**Forgalomba hozatali engedély száma:** 6300/731-3/2021. NÉBIH

**Forgalmazási kategória:** I.

**UFI:** W660-K07P-Y00A-F4SQ

**AZ ENGEDÉLYOKIRAT TULAJDONOSA,**

**A NÖVENYVÉDŐ SZER GYÁRTÓJA**

**GLOBACHEM N.V.**

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019

B 3800 St-Truiden, Belgium

Tel: +32 11 78 57 17



**FORGALMAZZA**

**AGROMETRY KFT.**

2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.

Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu

www.agrometry.hu



**Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:** a csomagolóburkolaton található.

**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN  
BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.  
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!  
GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.**

Nettó tartalom: **5 liter**

Agrometry