

SAVANNA 50 DF

GYOMIRTÓ SZER

Párhuzamos behozatali engedélytulajdonos:

Agrometry Kft.

2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.

Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu

www.agrometry.hu

Referencia szer engedélytulajdonosa:

FMC-Agro Hungary Kft.

1027 Budapest, Ganz utca 16.

Gyártója:

FMC International Switzerland Sàrl (Svájc)

Nettó tartalom: **120 g**

Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag-tartalom:

500 g/kg (50 %m/m) trifluszulfuron-metil

UFI: G71K-4T7C-R20H-MA0G

Párhuzamos behozatali engedély száma:

6300/434-1/2021 NÉBIH

Forgalmazási kategória: I.

Származási ország: Szlovákia

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.




A Savanna 50 DF készítmény azonos a
04.2/3628-1/2016. NÉBIH engedélyszámú

Safari 50 DF referenciatermékkel.



Figyelem



A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Agrometry





EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:

H351 Feltehetően rákot okoz. **H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **P202** Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. **P280** Védőkesztyű használata kötelező. **P308+P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P405** Elzárva tartandó. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.



Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! **SPe 2** A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja! **SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Élmezés-egészségügyi várakozási idő:

előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknak: védőkesztyű.

Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.






ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb három alkalommal használható!

Cukorrépában a készítményt a kultúrnövény két valódi leveles állapotától sorzáródás végéig kell kijuttatni 30 g/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles állapotától 2 leveles fejlettségéig kell kijuttatni a készítményt. Amennyiben újabb kezelés(ek)re lenne szükség, azt mindig a gyomok szikleveles állapotától 2 leveles állapotáig kell elvégezni (a két kezelés között 7-14 nap eltéréssel).




A készítmény csak a kikelt gyomnövényeket pusztítja el, tartós hatása nincs. A permetléhez minden esetben permetezőszer segédanyagot (nem ionos nedvesítőszer) kell adagolni.

A készítmény hatékony a selyemmályva, szerbtövis fajok, szőrös disznóparéj, parlagfű, ebszíkű, mezei tixszem, pásztortáska, tarka kenderkefű, ragadós galaj, árvakelésű napraforgó*, árvacsalan fajok, egynyári szélfű, fekete ebszőlő, lapulevelű keserűfű, baracklevelű keserűfű, vadrepce, perzsa veronika ellen (*csak a hagyományos, vagyis nem tribenuron-metil toleráns és nem imazamox-toleráns árvakelés ellen).

Hatáskiegészítés céljából a készítmény kombinálható fenmedifam, dezmedifam, kloridazon, etofumezát, metamitron hatóanyagú készítményekkel. A trifluszulfuron-metil és fenmedifam kombinációt metamitron hatóanyagú készítmény alacsonyabb, - annak engedélyezett dóziséval eltérően - 490 g hatóanyag/ha dóziséval kombinálva is ki lehet juttatni. A készítményt csak egyenletesen fejlett, növényi kórokozóktól, rovarkártevőktől mentes répaállományra lehet kipermetezni. Ha a hőmérséklet a 25 °C-t a tervezett védekezés időpontját követő 6 órán át meghaladja, a permetezést az esti órákban kell végrehajtani. A permetezés után a gépet 1 %-os szalmiákszeszes oldattal kell átmosni.

Normál vetésváltás esetén bármilyen szántóföldi kultúrnövény vethető a normál vetésidő betartásával. Kertészeti, zöldség és dísnövény kultúrák vetése, telepítése előtt kérje ki a gyártó cég munkatársainak véleményét. A kultúrnövény kipusztulása esetén 4 hónapon belül cukorrépával, tavaszi árpával, vagy lennel vethető újra a terület.



A trifluszulfuron-metil hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.



A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Kezelések között eltelt időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer (g/ha)	víz (l/ha)	
cukorrépa	magról kelő kétszikű gyomnövények	3	7-14	30	200-300	2 leveles állapottól sorzáródás végéig (BBCH 12-39)

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!



CSEBER Nonprofit Kft.

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

SAVANNA 50 DF

GYOMIRTÓ SZER

Párhuzamos behozatali engedélytulajdonos:

Agrometry Kft.

2000 Szentendre, Kisfóráás u. 30.

Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu

www.agrometry.hu

Referencia szer engedélytulajdonosa:

FMC-Agro Hungary Kft.

1027 Budapest, Ganz utca 16.

Gyártója:

FMC International Switzerland Sàrl (Svájc)

Nettó tartalom: **120 g**

Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag-tartalom:

500 g/kg (50 %m/m) trifluszulfuron-metil

UFI: G71K-4T7C-R20H-MA0G

Párhuzamos behozatali engedély száma:

6300/434-1/2021 NÉBIH

Forgalmazási kategória: I.

Származási ország: Szlovákia

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.




A Savanna 50 DF készítmény azonos a
04.2/3628-1/2016. NÉBIH engedélyszámú

Safari 50 DF referenciatermékkel.



Figyelem



A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Agrometry